

SYNTHESE des utilisations HORS AMM de la MOXIDECTINE

Ces utilisations sont sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur,

**Moxidectine
HORS AMM**

Sous la responsabilité du prescripteur

Espèce	Utilisation	Produit	Posologie	Rythme de traitement	référence	commentaires
Autruches	infestations par <i>Libyostrongylus douglassi</i>	Cydectine Injectable Cydectine orale ovins	Intra-musculaire, 1ml/50kg per os, 2ml/10kg	1 fois	essai interne 864-A-SA-01-96	AMM en Afrique du Sud
					essai interne 866-A-SA-03-01	
Antilopes	Infestations par des nématodes, notamment Trichuris	Cydectine Orale	per os, 2ml/10kg	1 fois	ZOO	cf. commentaires "singes"
Cerfs	nématodes <i>Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Dictyocaulus</i>	Cydectine Pour On	pour on, 1ml/10kg	1 fois rémanence 56 jours	essai interne 863-M-NZ-14-95	AMM en Australie (temps d'attente 7 jours) AMM en N-Zélande (temps d'attente 21 jours)
Cheval	parasites internes	Cydectine injectable	intra-musculaire, 1ml/50kg; 1,5ml/50kg; 2ml/50kg per os, 1ml/50kg; 1,5ml/50kg; 2ml/50kg	1 fois	veterinary parasitology 41, 255-284	
Chèvres	infestations par <i>Sarcoptes scabiei var. rupicaprae</i>	Cydectine injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg ! <i>Alvinerie conseille de doubler la dose chez les chèvres</i>	2 fois à 19 jours d'intervalle	Essai interne 866-0-IT-04-98	
	strongles - chez la chèvre laitière	Cydectine orale ovins	per os, 4ml/10kg	1 fois	bulletin des GTV	TA lait=7 jours
Chiens	gale sarcoptique notamment chez des Colleys	Cydectine injectable	sous-cutanée, 1ml/25kg	2 fois à 15 jours d'intervalle	Action Vétérinaire 1347, decembre 1995	certains utilisent la Cydectine orale ovins (posologie à adapter, le produit étant 10 fois moins dosé en moxidectine), pour une meilleure tolérance à l'ingestion. Certains préfèrent, en cas de réaction au traitement inj per os (eubriété, signes nerveux qui vont en s'aggravant quelques jours après le début du traitement), arreter le traitement quelques jours le temps que l'animal retrouve son état normal puis reprend le traitement injectable per os à demi dose et augmente progressivement chaque jour la dose administrée.
	gale sarcoptique		sous-cutanée, 1-1,25ml/50kg per os, 1-1,25ml/50kg	1 fois par semaine jusqu'à disparition des signes cliniques (soit entre 3 et 6 semaines)	Vet Parasitology	
	démodicé		per os, 1ml/50kg le 1er jour; 1,5ml/50kg le 2ème jour; 2ml/50kg le 3ème jour puis 2ml/50kg les jours suivants	tous les jours pendant 42 à 120 jours (2 raclages cutanés négatifs successifs)		
	démodicé notamment chez les Colleys, Bobtails, Bearded Colley, Berger Australien	Cydectine Injectable	per os, 1,5ml à 3ml/50kg/jour	tous les jours pendant 5 à 12 mois (2 raclages cutanés négatifs successifs)	CNVSPA Eric Guaguère	
	démodicé	Cydectine Injectable	per os, 2ml/50kg/jour	tous les jours pendant 1 à 4 mois (2 raclages cutanés négatifs successifs)	GEDAC Emmanuel Besignor, Carlotti	
	démodicé	Cydectine Injectable	per os, 2ml/50kg/jour	tous les jours pendant en moyenne 70 à 142 jours	"Dépêche vétérinaire 569 ESVD-ECVD Maastricht 1998"	
	gale sarcoptique	Cydectine Injectable	sous-cutanée, 1,25ml/50kg	1 fois par semaine pendant 3 semaines		
	Otodectes	Cydectine Injectable	per os, 1ml/50kg sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois	CES IV de dermatologie JM Canu 1997	
	Infestations par <i>Thelazia callipaeda</i>	Cydectine Injectable	instillation oculaire de 1 à 2 gouttes/œil	1 fois	Università degli Studi di Bari Facoltà di medicina veterinaria Vet Record, 154 (2004) 143-147	

SYNTHESE des utilisations HORS AMM de la MOXIDECTINE

Ces utilisations sont sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur,

**Moxidectine
HORS AMM**

Sous la responsabilité du prescripteur

	Infestations par <i>Toxocara canis</i>	Cydoctine Injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois	Faculté vétérinaire Istanbul 1999	
Chameaux Dromadaires		Cydoctine Injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg		Vet. Parasitology, 83, 151-159	
Chats	otacariose (gale des oreilles)	Cydoctine Injectable	sous-cutanée, 1ml/10kg	2 fois à 15 jours d'intervalle	Action Vétérinaire 1347, decembre 1995	
	nématodes <i>Toxocara catti, Ancylostoma tubeiforme</i>		sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois	AMMVEPE vol 8, N°3	
Dophins	mammites parasitaires <i>Crassicauda sp.</i>	Cydoctine Injectable	per os, 2,5ml/50kg	échec du traitement	parc océanique Hong Kong	
Hamsters	gale notoédrique	Cydoctine orale ovins	per os, 4ml/10kg	1 fois/semaine pendant 8 semaines 2 fois/semaine pendant 8 semaines	vet record, 149, 324-327	
Lamas	infestations par les tiques <i>Haemaphysalis, Boophilus microplus, Ixodes holocyclus</i>	Cydoctine Injectable	0,5ml/50kg	1 fois rémanence 42 jours	Control & Therapy Series, Mailing 181	
	gale sarcoptique <i>Sarcoptes scabiei var. aucheniae</i>	Cydoctine Injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois rémanence 15 jours	Essai interne 0889-ALP-PE-02-00	
	gale sarcoptique <i>Sarcoptes scabiei var. aucheniae</i>	Cydoctine Injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois rémanence 60 jours	Essai interne 0889-LLA-BO-01-00	
	infestations par des nématodes	Cydoctine Injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois rémanence 20 jours	Essai interne 0889-ALP-PE-01-00	
	infestations par des nématodes digestifs et respiratoires	Cydoctine Injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois	Essai interne 0889-LLA-BO-02-00	
Lapins	gale psoroptique	Cydoctine Injectable	sous-cutanée, 2ml/50kg	2 fois à 10 jours d'intervalle	"Dépêche vétérinaire 569 ESVD-ECVD Maastricht 1998"	
			sous-cutanée, 1ml/50kg per os, 1ml/50kg		Vet Parasitology 93, 149-158	
Oiseaux de cage	infestations par des acariens des plumes	Cydoctine orale ovins	application cutanée 1 à 5 gouttes entre les épaules	2 fois à 3 semaines d'intervalle		
Tumix melano	Infestations par <i>Capillaria contorta</i>	?	per os, 200-400µg moxidectine/kg dans l'eau de boisson	2 fois à 2 semaines d'intervalle		ces utilisations sont relatées en Australie. Le produit utilisé semble être la Cydoctine Orale ovins que les vétérinaires diluent et administrent per os
Oiseaux de cage	Infestations par <i>Ascaris, Capillaria, Cnemidocoptes, Sternostoma</i>	?	per os, 200µg moxidectine/kg dans l'eau de boisson	1 fois		
Psitticinés	infestations par des nématodes	?	200µg moxidectine/kg	1 fois		
Gymnorhina tibicen (Magpies)	infestations par <i>Cliaenspirura gymnorhihuris</i>	?	400µg moxidectine/kg	1 fois		
Colubriformes	Infestations par <i>Ascaris, Capillaria, autres vers</i>	?	200µg moxidectine/kg	1 fois		
Colubriformes	infestations par des acariens des plumes	?	500µg moxidectine/kg/jour	tous les jours pendant 1 semaine		

SYNTHESE des utilisations HORS AMM de la MOXIDECTINE

Ces utilisations sont sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur,

**Moxidectine
HORS AMM**

Sous la responsabilité du prescripteur

Ours	Infestations par des nématodes	Equest	per os, 200µg moxidectine/kg en mélangeant le produit avec de la confiture NB: Equest étant dosé à 400µg/kg, il faut utiliser la moitié de la dose pour chevaux	1 fois	Zoo de Copenhague 2001	
	infestation par des nématodes	Cydecitine 1% injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois	Gestion des ours dans les Pyrénées	Traitement réalisé lors de l'importation d'ours de Slovénie
Phoques	Infestations par <i>Otostrongylus circumlitus</i> , <i>Parafilaroides gymnuris</i>	Cydecitine Injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois	Vet. Record, 152, 130-134	
Pigeons	Infestations par <i>Capillaria sp.</i>	Cydecitine Injectable	Intra-musculaire, 1ml/50kg	1 fois rémanence 21 jours	Journal of Veterinary and Animal Sciences 19 (1995) 133-134	pour un dosage plus précis, 1 volume de cydecitine était dilué dans 24 volumes d'eau stérile
Porcs	Infestations par <i>Strobyloides ransomi</i> , <i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Trichuris suis</i> , <i>Ascaris suum</i> , <i>Sarcoptes</i>	Cydecitine Injectable	1,5ml/50kg	1 fois	Medycyna Wet 50 (2) 1994	
	Infestations par des nématodes et poux	Cydecitine Injectable	sous-cutanée, 1ml/50kg	1 fois	Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej W Szczecinie, NR 163, 1994	
	Infestations par des nématodes	Cydecitine Pour On	Pour on, 1,5ml/10kg; 2ml/10kg; 2,5ml/10kg; 3ml/10kg	1 fois	Veterinary Parasitology 87 (1999) 39-44	
Raton laveur	Infestations par <i>Baylisascaris procyonis</i>	Cydecitine orale ovins	per os, 10ml/10kg	1 fois	Vet parasitology 60, 155-159	
Rennes	Infestations par des nématodes	Cydecitine Injectable	sous-cutanée, 2ml/50kg	1 fois rémanence 56 jours	Vet record, 147 (2000) 570-573	
Rhinocéros	Infestations par la gale	Cydecitine Injectable	1ml/50kg	?	Kruger National Parc	
Poulets	Infestations par des nématodes et <i>Syngamus trachea</i>	Cydecitine orale ovins Cydecitine Injectable Cydecitine Pour On	per os, 2ml/10kg intra-musculaire, 1ml/50kg pour on, 1ml/10kg	1 fois rémanence 7 jours	Magyar allatorvosok lapja 1996, December	
Budgerigars	Infestations par la gale <i>Cnemidocoptes pilae</i>	Cydecitine Injectable	application cutanée 0,1ml/oiseau	2 fois à 10 jours d'intervalle	Faculté vétérinaire Istanbul 1996	
Poules pondeuses	Infestations par <i>Dermanyssus gallinae</i>	Cydecitine Injectable	intra-péritonéale, 20ml/50kg 40ml/50kg 50ml/50kg	1 fois	Revue Med. Vet., 148, 433-438	inefficacité toxicité
Singes	Infestations par des nématodes, notamment <i>Trichuris</i>	Cydecitine Orale	per os, 2ml/10kg	1 fois	ZOO	en cas de forte infestation, l'efficacité contre les <i>Trichuris</i> peut être insuffisante. Un traitement symptomatique de la diarrhée est conseillé pour ralentir le transit et favoriser l'action anthelminthique contre ces parasites qui vivent libres dans la lumière et se nourrissent des aliments pré-digérés.

SYNTHESE des utilisations HORS AMM de la MOXIDECTINE

Ces utilisations sont sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur,

**Moxidectine
HORS AMM**

Sous la responsabilité du prescripteur

